

BCG- vaccinatie

Wat u moet weten
na de vaccinatie





BCG-vaccinatie

Wat u moet weten na de vaccinatie


Uw kind heeft de BCG vaccinatie (tegen tuberculose) gekregen. Het is belangrijk dat het wondje wat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld wordt. In deze flyer leest u wat wel en niet mag.

Wat kunt u verwachten na de BCG vaccinatie?

Uw kindje wordt niet ziek van deze vaccinatie en krijgt ook geen koorts. Een aantal weken na de BCG prik kan er op de plek van de vaccinatie roodheid ontstaan. Langzaam kan deze verkleuren en eruit zien als een blauw/paarsachtige verdikking (lijkt op een zweertje of abces). Het kan soms meer dan een half jaar duren voor het wondje helemaal dicht en genezen is. Nadat het zweertje genezen is blijft er een klein litteken te zien.

Wat moet u doen na de BCG vaccinatie?

- Uw kind mag gewoon in bad/douchen. De vaccinatie plek daarna goed afdrogen.
- Het zweertje op de plek van de vaccinatie niet aanraken en/of uitknijpen. Er kan bloed/pus uitkomen. Dit is normaal.
- Zodra er een zweertje ontstaat, geen zalfjes smeren, geen alcohol deppen en geen pleister erop doen.
- U kunt eventueel een droog gaasje plakken (alleen de zijkanten dichtplakken).



Let op!!

Als u opgezette hals en oksel klieren voelt of u vertrouwt na enkele maanden de BCG reactie niet, neem dan contact op met de TBC afdeling van de GGD op telefoonnummer 010-4339540.